

Confusion Assessment Method (CAM)

(Inouye 1990, dt. Version Bickel 2007)

| Zur Diagnosesicherung des Delirs | | Kriterium | |
|--|--|--|----|
| Beginn Gibt es Hinweise auf eine akute psychische Veränderung gegenüber dem Ausgangsbefund? | | plötzlich - akut | 1a |
| Verlauf Fluktuiert das auffällige Verhalten im Tagesverlauf? Tritt es wiederkehrend auf oder verändert es sich im Schweregrad? Wichtig: Außenanamnese | | fluktuierend | 1b |
| Aufmerksamkeit Hat die/der Patient:in Mühe, sich zu konzentrieren? Ist die/der Patient:in leicht ablenkbar oder hat Schwierigkeiten, dem Gespräch zu folgen? | | gestört | 2 |
| Denkstörung Ist das Denken der Patientin/des Patienten desorganisiert oder inkohärent? Redet sie/er weitschweifig und belanglos daher, ist der Gedankengang unklar und unlogisch, springt sie/er unvorhersehbar von einem Thema zum anderen? | | auffällig | 3 |
| Bewusstseinszustand Trifft eine der Beschreibungen auf den Bewusstseinszustand der Patientin/des Patienten zu? hyperalert-schreckhaft lethargisch, schläfrig, aber leicht weckbar stuporös, schwer weckbar | | verändert | 4 |
| Bewertung | | | |
| Delir wahrscheinlich bis sicher | | 1a UND 1b + 2 + 3 oder 4 | |
| Delir möglich | | 1a ODER 1b + 2 + 3 oder 4 | |
| Sonst kein Delir | | Autorin: Elisabeth Höpperger, MSc | |